

# Virocid®

## Procedura dotycząca produktu

### ETAP 1



Podstawą dobrej dezynfekcji jest dobrze wyczyszczone i suche pomieszczenie dla zwierząt.

### ETAP 2



Zastosować oprysk lub pianę w stężeniu 0,25-0,5%. Użyć 0,3-0,4 L roztworu na 1m<sup>2</sup>.

### ETAP 3



Zamgławić pomieszczenie za pomocą Virocid (1-2l Virocid + 3 l wody). Pozostawić pomieszczenie zamknięte przez 24 godziny. Całkowicie zamknąć pomieszczenie dla zwierząt. Upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma nikogo.

### ETAP 4



Zamgławić pomieszczenie za pomocą Virocid (1-2l Virocid + 3 l wody).

### MATERIAŁY

- lanca pianowa
- Urządzenie do zamgławiania
- Virocid®



### INFORMACJE TECHNICZNE

X X X X X X X X  
X X X X X X X X  
X X X X X X X X

Budne pomieszczenie przed myciem zawiera mikroorganizmy



X X X X X X X X

Dobre mycie usuwa większość brudu



Strefa działania Virocid®

X X X X X X X X

Dezynfekcja może dotrzeć do wszystkich mikroorganizmów



Dobre efekty dezynfekcji: brak jest jakichkolwiek, pozostawionych mikroorganizmów



X X X X X X X X  
X X X X X X X X

Niefektywne mycie



Strefa działania Virocid®

X X X X X X X X  
X X X X X X X X

Dezynfekcja nie może dotrzeć do wszystkich mikroorganizmów



X X X X X X X

Niedobre efekty dezynfekcji: nadal pozostały mikroorganizmy