

Pediluve Kickstart



MÉTHODE

L'acide peracétique réagit avec un dérivé de phénol pour former un colorant violet. La concentration de l'acide peracétique est mesurée semi-quantitativement par comparaison visuelle de la zone de réaction de la bandelette de test avec les champs d'une échelle de couleur.



ÉTAPE 1

Application

Pediluve: 2% Kickstart.

l'eau	Kickstart
1l	20 ml
5l	100 ml
10l	200 ml
15l	300 ml

ÉTAPE 2

Procédure

1. Agiter brièvement la solution avant d'immerger la bandelette réactive.
2. Plonger la zone réactionnelle de la bandelette réactive dans la solution pendant 2 secondes.
3. Laisser l'excès de liquide s'écouler par le bord long de la bande sur une serviette en papier absorbant.
4. Attendez 30 secondes.
5. Déterminer avec quel champ de couleur sur l'étiquette la couleur de la zone de réaction coïncide le plus exactement.

ÉTAPE 3

Remarque

- Refermer immédiatement le tube contenant les bandelettes réactives après utilisation.
- Si la bandelette reste jaune, il est temps de changer la solution (2 jours avec contamination sévère)

Color	0	500	1000mg/l	1500	2000
Concentration	0%	1%	2%	3%	4%

CID LINES®