

Kritische punten op een pluimveebedrijf:


Dagelijkse handelingen op uw bedrijf

Vleeskippen groeien enorm snel... In 6 weken is de productiecyclus voltooid en moeten de kippen klaar zijn voor de slacht. Dit betekent ook dat pluimveehouders hun dieren de beste zorgen moeten geven, vooral in het begin. Men kan beter problemen in een vroeg stadium vaststellen en zo snel mogelijk naar oplossingen zoeken.

Geef je dieren de best mogelijke start

De eerste week, in het bijzonder de allereerste levensdag, is cruciaal om een goede productiecyclus te garanderen. Wanneer de ééndagskuikens op het bedrijf aankomen, hebben ze reeds een stressvolle tijd achter de rug en werd het grootste deel van hun reserves alvast benut.

Zorg ervoor dat uw pluimveestal helemaal klaar is om de kuikens te ontvangen:



- Zorg voor een veilige en stabiele leefomgeving door het uitvoeren van een doeltreffende reiniging en desinfectie tijdens de leegstandsperiode in uw stal. Ééndagskuikens hebben nog geen sterke, eigen darmflora en zullen allerlei micro-organismen uit hun omgeving oppikken.
- Verschaf onmiddellijke toegang tot water en voeder aan de dieren. Ééndagskuikens moeten zo snel mogelijk drinken en eten om hun reserves aan te vullen en om een productieve vleeskip te kunnen worden. Garandeer voldoende voeder op het kuikenpapier zodat de dieren de eerste dagen gemakkelijk voeder kunnen vinden.
- Verzeker een goed stalklimaat. Controleer regelmatig de temperatuur en ventilatie in uw stal en zorg voor droog strooisel.

Check uw dieren

Om vroege problemen op te sporen, is het erg belangrijk om uw kippen dagelijks goed op te volgen. Op deze manier kunt u op het juiste moment ingrijpen en de schade in uw pluimveestal beperken. Het wordt ten zeerste aanbevolen om twee keer of ten minste één keer per dag een rondgang te doen doorheen uw stal:

- Haal dode dieren zo snel mogelijk uit uw stal om overdracht van ziektekiemen te voorkomen. Dode kippen zijn vaak een belangrijke bron van infectie voor de rest van uw dieren.
- Kijk goed naar uw dieren en inspecteer ook hun uitwerpselen op afwijkingen.

- Controleer de algemene verdeling van uw dieren in de stal om te zien of de temperatuur goed is. Als de temperatuur te laag is, troepen alle dieren heel dicht samen. Normaal gesproken zullen ze zich bij een optimale temperatuur verdelen in kleine groepen van 20 tot 30 dieren. Bij een te hoge temperatuur zullen ze niet samen zitten en gaan ze vaak op zoek naar de koudere plaatsen langs de muren van het gebouw
- Controleer ook de verdeling van uw dieren rond de voeder- en drinkwaterlijnen om problemen zoals verstopping van de drinknippels of voederpannen op te sporen.
- Pas de hoogte van de drinklijnen elke dag aan want uw dieren groeien zeer snel. Om een optimale wateropname te garanderen, moeten de kippen het drinkwater gemakkelijk kunnen bereiken.
- Identificeer mogelijke doodsoorzaken en vraag uw dierenarts om indien nodig autopsies uit te voeren om een bepaalde ziekte te detecteren.
- Stel samen met uw dierenarts een effectief vaccinatieprogramma op, aangepast aan uw bedrijf.

Source: De Gussem M., van Middelkoop K., van Mullem K. and van 't Veer E., 2013. Broiler signals, a practical guide to broiler focused management. Roodbont Publishers B.V., Zutphen, The Netherlands.