

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń dla zwierząt

Virocid®

ETAP 1	ETAP 2	ETAP 3	ETAP 4	ETAP 5
Podstawą dobrej dezynfekcji jest dobrze suche i suche pomieszczenie dla zwierząt.	Zastosować oprysk Virocid® w stężeniu 0,25%- 0,5%. Użyć 0,3-0,4L roztworu na 1 m ²	Zamknąć pomieszczenie dla zwierząt. Upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma nikogo.	Zamgławiać za pomocą Virocid® (1-2l Virocid® + 3l wody na 1000 m ³). Pozostawić budynek zamknięty przez 24 godziny.	Przewentylować pomieszczenie przed wprowadzeniem zwierząt.

MATERIAŁY

- Opryskiwacz lub lanca pianowa
- Virocid®
- Urządzenie do zamgławiania



INFORMACJE TECHNICZNE

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

Brudne pomieszczenie przed myciem zawiera mikroorganizmy



X X X X X X X X

Dobre mycie usuwa większość zanieczyszczeń



Strefa działania Virocid®

X X X X X X X X

Dezynfekcja może dotrzeć do wszystkich mikroorganizmów



Dobre efekty dezynfekcji: brak jest jakichkolwiek mikroorganizmów



X X X X X X X X
X X X X X X X X

Nieefektywne mycie



Strefa działania Virocid®

X X X X X X X X
X X X X X X X X

Dezynfekcja nie może dotrzeć do wszystkich mikroorganizmów



X X X X X X X
Nieskuteczna dezynfekcji: nadal pozostaje część mikroorganizmy

INFORMACJE BHP

